z.B.* harmonischer Oszillator $m\ddot{x} = -kx$

$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$, $x(t_0=0) = x_0 = 0$

zur Teilaufgabe

$$\rightarrow \pm\sqrt{\frac{m}{2}} \int_0^x \frac{d\bar{x}}{(E - \frac{1}{2}k\bar{x}^2)^{1/2}} = t$$

geht ebenfalls mit direkter Lsg. von Mathematica!! — 2!

$$\bar{x} = \left(\frac{2E}{k}\right)^{1/2} \bar{y}$$

$$\rightarrow \left(\frac{m}{2E}\right)^{1/2} \left(\frac{2E}{k}\right)^{1/2} \int_0^y \frac{d\bar{y}}{(1-\bar{y}^2)^{1/2}} = t$$

$\bar{y} = \sin\bar{\varphi}$, $d\bar{y} = \cos\bar{\varphi}\, d\bar{\varphi}$

$$\int_0^{\varphi} d\bar{\varphi} \frac{\cos\bar{\varphi}}{(1-\sin^2\bar{\varphi})^{1/2}} = \varphi \; !$$

$$x = \left(\frac{2E}{k}\right)^{1/2} \sin\varphi = \left(\frac{2E}{k}\right)^{1/2} \sin\underbrace{\left(\frac{k}{m}\right)^{1/2} t}_{\omega} \quad \checkmark \text{ o.k.}$$

---

wichtige Bem.

$E = \frac{k}{2} x_{max}^2$! ✓ check

Beliebiges Potential $V(x)$ mit Minimum bei $x = x_0$:



entwickle dort nach Taylor

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x-x_0) + V''(x_0)\frac{(x-x_0)^2}{2!} + \ldots$$

$V' = -F = 0$ am Minimum $\Rightarrow$ $V(x) \approx V(x_0) + V''(x_0)\frac{(x-x_0)^2}{2!}$

(harm. Oszillator!)